



# LA BONDRÉE APIVORE

*Pernis apivorus*



## NOURRITURE

- La Bondrée apivore, comme son nom l'indique, est insectivore. Elle apprécie surtout les abeilles, guêpes, et bourdons, ainsi que leurs larves et leurs œufs. Parfois, elle peut aussi capturer des grenouilles, des lézards, des petites couleuvres, des oiseaux et des petits mammifères.
- Elle déterre sa nourriture en creusant le sol avec ses griffes, jusqu'à 40 cm de profondeur, à la recherche des œufs et larves d'insectes.



- 1 Abeille sauvage  
(© Olivier Brosseau - METL-MEDDE)
- 2 Bourdon  
(© Daniel Coutelier - METL-MEDDE)
- 3 Guêpe  
(© Olivier Brosseau - METL-MEDDE)
- 4 Nid de la Bondrée apivore  
(© Biosphoto - Anthony Leclerc)
- 5 Œuf de Bondrée apivore  
(© Biosphoto - J. Van Arkel - Foto Natura)

## HABITAT (SUITE)

### NID

- Le nid est construit au même endroit d'une année sur l'autre, sur la branche d'un grand arbre (au moins 10 mètres de haut).
- D'un diamètre de 65 à 80 cm, le nid est constitué de branches portant encore des feuilles. Utilisé plusieurs années, il est régulièrement garni de rameaux feuillés.
- La Bondrée apivore, opportuniste, utilise également les nids d'autres espèces d'oiseaux (corneille).



### ŒUFS

- 2 œufs. La période d'incubation dure de 30 à 35 jours.
- Les œufs sont blancs, tachetés de brun.
- Le mâle et la femelle se relaient à tour de rôle pour couvrir et nourrir les petits.

## COMPORTEMENT

### REPRODUCTION

- Sa reproduction est assez tardive (juin) en raison de la migration.
- Les jeunes quittent le nid au bout de 40 jours, vers la mi-août.

### ALIMENTATION

- Ses narines sont étroites, en forme de fentes, afin d'éviter la pénétration des insectes, de la terre et de la cire lorsqu'elle cherche à se nourrir.
- Pour nourrir ses petits, le couple de Bondrées apivore se complète : le mâle apporte des rayons de nids de guêpes, la femelle en extrait les larves pour nourrir les oisillons.

## MENACES

### Nombre de Bondrées apivores en France :

10 000 à 15 000 couples en France, dont 150 à 200 couples en Île-de-France (1 couple en Seine-Saint-Denis).

- La chasse dans le sud de l'Europe.
- Le dérangement en période de nidification.
- La diminution de ses ressources alimentaires liée à l'utilisation d'insecticides.



## GESTION

Les moyens mis en place sur le site de Seine-Saint-Denis pour la préservation de la Bondrée apivore sont :

- L'identification des sites de nidification afin de mieux prendre en compte les menaces potentielles et les actions de gestion à mener.
- La régénération des boisements, afin de maintenir, à long terme, des arbres âgés.
- Le maintien des lisières forestières afin de favoriser les hyménoptères (guêpes, bourdons, abeilles...), dont se nourrit la Bondrée apivore.



# LA BONDRÉE APIVORE

*Pernis apivorus*



BOIS ET FORÊTS

## CARTE D'IDENTITÉ

**TAILLE :** 55 à 60 cm

**POIDS :** 600 g à 1 kg

**ENVERGURE :** 130 à 140 cm

**DURÉE DE VIE :**

29 ans en moyenne

**FAMILLE :**

Accipitridés (Aigles, Bondrées, Busards, Buses, Circaètes, Éperviers, Milans, Pygargues Vautours...).

**CARACTÉRISTIQUES :**

La Bondrée apivore est un rapace de taille moyenne, avec un plumage de couleur variable. Le dessus du corps est plutôt brun-roux, et le ventre beige tacheté de marron. Elle ressemble beaucoup à la Buse variable, ce qui rend son identification difficile, mais elle est un peu plus grande et ses ailes sont plus longues. Le mâle, plus petit, a une tête gris bleuté. Les adultes se distinguent des juvéniles par une large bande sombre au niveau postérieur de l'aile et à la base de la queue.

**SON CHANT :**

Celui de la femelle correspond à un « whee-oo » ou « whi-whee-oo » clair et mélodieux. Celui du mâle, en vol, ressemble à « pleelu ». C'est un oiseau discret et silencieux, sauf quand il est en couple ou en migration. La communication se fait par des sifflements sourds au nid, avec des cris mélodieux et des cliquetis.



Bondrée apivore  
(© Biosphoto - Régis Cavignaux)

Les Bondrées forment un couple de parents exemplaire. Le mâle apporte des rayons de nids de guêpes et la femelle en extrait les larves pour nourrir les oisillons.

## L'ANNÉE DE LA BONDRÉE APIVORE

ARRIVÉE	SAISON DES AMOURS	PONTE DES ŒUFS	ÉCLOSION DES ŒUFS	ENVOL DES JEUNES	DÉPART
DÉBUT MAI	MAI-JUIN	PREMIÈRE QUINZAINE DE JUIN	DÉBUT JUILLET	ENTRE MI-AOÛT ET DÉBUT SEPTEMBRE	FIN SEPTEMBRE
FRANCE					AFRIQUE

## MIGRATION

Cet oiseau passe l'hiver en Afrique tropicale, de la Guinée à l'Angola et jusqu'à l'Afrique du Sud.

## HABITAT

### LIEU DE VIE DE LA BONDRÉE APIVORE

La Bondrée apivore fait son nid dans des grands boisements peu denses et chasse à proximité, dans des terrains découverts et semi-boisés (lisières, clairières, fiches...). Elle apprécie les zones humides ou les cours d'eau sur son territoire.

### EN SEINE-SAINT-DENIS

Cet oiseau est susceptible d'être vu dans le bois de Bernouille, dans la forêt de Bondy, sur les coteaux de l'Aulnoye, au parc de la Haute-Île, au futur parc intercommunal du plateau d'Avron, au parc Georges-Valbon, au parc du Sausset et au parc des Beaumonts.

