



LE BUTOR ÉTOILÉ

Botaurus stellaris



ÉTANGS ET RIVIÈRES

CARTE D'IDENTITÉ

TAILLE: 70 à 80 cm

POIDS: environ 1 kg

ENVERGURE: 100 à 130 cm

DURÉE DE VIE:

11 ans en moyenne

FAMILLE:

Ardéidés (Hérons, Blongios, Butors, Aigrettes, Bihoreaux.).

CARACTÉRISTIQUES:

Le Butor étoilé est un échassier de grande taille, au plumage brun clair à reflets dorés, moucheté de noir. Sa tête est ornée d'une calotte et de moustaches noirâtres. Les mâles et les femelles ont un plumage semblable, mais le mâle se distingue par la couleur bleutée de son bec en période de reproduction (février).

SON CHANT:

Le mâle pousse un appel rauque et puissant «Hoump...» repris toutes les deux à trois minutes. Il s'entend de 1 à 2 km à la ronde, parfois plus quand il est porté par le vent.

Son souffle ressemble à une « corne de brume », une contrebasse ou encore à celui d'un taureau, ce qui lui vaut le surnom de « bœuf des marais ». On l'entend plutôt au crépuscule ou à l'aube.



Butor étoilé
(© Biosphoto - Geoff Trinder Ardea)



Butor étoilé en posture de camouflage
(© Biosphoto - Frédéric Desmette)

L'ANNÉE DU BUTOR ÉTOILÉ

SAISON DES AMOURS	PONTE DES ŒUFS	ÉCLOSION DES ŒUFS	ENVOL DES JEUNES	DÉPART
FÉVRIER	AVRIL À JUIN	MAI À JUILLET	JUILLET À SEPTEMBRE	OCTOBRE À DÉCEMBRE
FRANCE			SUD DE LA FRANCE	

MIGRATION

Le Butor étoilé reste généralement en France toute l'année mais les populations du nord du territoire peuvent se déplacer un peu plus vers le sud, lors d'hivers rigoureux.

HABITAT

LIEU DE VIE DU BUTOR ÉTOILÉ

Les roselières des grands marais, d'eau douce ou saumâtre. Il doit pouvoir disposer de plus de 20 hectares d'un seul tenant pour installer son nid.

EN SEINE-SAINT-DENIS

On observe ponctuellement des Butors étoilés en migration ou en hivernage, dans les roselières du parc Georges-Valbon et du parc du Sausset.



1 Marais (© Arnaud Bouissou - MEDDTL)

2 Roseaux coupés (© Laurent Mignaux - MEDDTL)



LE BUTOR ÉTOILÉ

Botaurus stellaris



NOURRITURE

- Le Butor étoilé pêche à l'affût le long des rives des roselières, dans les eaux peu profondes.
- Il se nourrit de poissons, d'anguilles, de grenouilles, d'insectes aquatiques et parfois de jeunes oiseaux.



HABITAT (SUITE)

NID

- Le nid est construit par la femelle.
- Il est constitué de roseaux, et accroché à la roselière par des tiges et des plantes: il ressemble à un «radeau» flottant.
- Le nid est placé à 15 cm au-dessus de l'eau.



ŒUFS

- 3 à 7 œufs sont pondus une fois par an, entre début avril et début juin.
- Les œufs sont de couleur brun-vert, avec de petites taches de brun.
- La couvaison est entièrement assurée par la femelle.

COMPORTEMENT

Le Butor étoilé est le roi du camouflage:

- Il préfère rester caché dans les roseaux plutôt que voler.
- Il s'agrippe facilement sur les tiges de roseaux grâce à ses longs doigts.
- Lorsqu'il se sent en danger, il se cache, cou étiré et bec en l'air, pour se faire passer pour un roseau grâce à ses plumes de la même couleur. De fait, il est rarement visible dans son habitat: on pourra plus facilement l'apercevoir en vol, sur de courtes distances.

REPRODUCTION

- En février, le chant très sonore du mâle permet d'attirer les femelles et délimite son territoire.
- Durant la période de reproduction, les mâles se distinguent par leur couleur bleue à la base du bec.
- Le mâle est polygame, il s'accouple chaque année avec plusieurs femelles (1 à 5).

MENACES

Nombre de Butors étoilés en France: autour de 300 couples.

La population nicheuse est considérée comme «affaiblie» au niveau européen, «vulnérable» en France et éteinte en Île-de-France, même si des individus y sont observés occasionnellement.

- La disparition des zones humides et le fractionnement des roselières, qui réduisent son habitat.
- La pollution accidentelle des eaux, qui limite la ressource alimentaire disponible.
- Le dérangement lié à la présence humaine (chiens qui détruisent les nids...).



GESTION

Les moyens mis en place sur le site de Seine-Saint-Denis pour la préservation du Butor étoilé sont:

- L'augmentation des surfaces en roselières.
- La limitation du dérangement des roselières, notamment par les chiens.