



LA GORGEBLEUE À MIROIR

Luscinia svecica



PRAIRIES

CARTE D'IDENTITÉ

TAILLE: 14 cm

POIDS: 15 à 23 g

DURÉE DE VIE:
8 ans en moyenne

FAMILLE:

Muscicapidés (Gobemouches, Rossignols, Rouges-gorges, Rouges-queues, Traquets...).

CARACTÉRISTIQUES:

La Gorgebleue à miroir est un petit oiseau élancé aux longues pattes fines. Son plumage est marron et son ventre est blanc. Le mâle a sur sa gorge une «bavette» bleue assortie d'une petite tache blanche ou rousse appelée «miroir» au milieu. La gorge et la poitrine de la femelle sont blanches, avec quelques taches noires. Les jeunes ont un plumage brun tacheté et une queue rousse moins étendue.

SON CHANT:

Son chant, très riche et varié, comprend beaucoup d'imitations d'autres espèces. Ainsi, ce chant peut ressembler à des «tuck-tuck», «tchak-tchak» ou «hweet».



Mâle et Femelle (© Biosphoto/Jean-Claude Carton)

La Gorgebleue à miroir tient son nom de la «bavette» bleu brillante qui orne la gorge du mâle. Au centre de cette partie bleue se trouve parfois une petite tache blanche ou rousse appelée «miroir».

L'ANNÉE DE LA GORGEBLEUE À MIROIR

| ARRIVÉE | SAISON DES AMOURS | PONTE DES ŒUFS | ÉCLOSION DES ŒUFS | ENVOL DES JEUNES | DÉPART |
|---------|----------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|
| MARS | MARS-AVRIL | DU 15 AU 30 AVRIL PUIS DU 15 AU 31 MAI | MAI-JUIN | JUIN-JUILLET | SEPTEMBRE |
| FRANCE | | | | | PORTUGAL ET ESPAGNE |

MIGRATION

La Gorgebleue à miroir passe l'hiver sur le littoral du Portugal et du sud de l'Espagne, et plus rarement en Afrique.

HABITAT

LIEU DE VIE DE LA GORGEBLEUE À MIROIR

Les zones humides : marais et abords de cours d'eau avec des buissons ou des roseaux.

Elle est également présente dans les exploitations agricoles (champs de colza principalement).

EN SEINE-SAINT-DENIS

Cet oiseau est susceptible d'être vu au parc de la Haute-Île, au parc Georges-Valbon, au parc du Sausset et au parc des Beaumonts.



1 Marais avec des arbustes
(© Laurent Mignaux - METL-MEDDE)



LA GORGEBLEUE À MIROIR

Luscinia svecica



NOURRITURE

- Elle se nourrit d'insectes qu'elle attrape en vol, de chenilles, de baies ou d'invertébrés (larves, mollusques, araignées, etc.) qu'elle trouve en fouillant le sol.
- Son régime est différent en hiver pendant sa migration : elle se nourrit sur les plages de vase de petits crustacés, de vers marins et d'invertébrés terrestres.



HABITAT (SUITE)

NID

- Le nid est construit sur le sol, dans un trou ou dans une touffe d'herbes.
- Il est constitué avec des herbes, de l'écorce, des racines, puis tapissé de mousse.



ŒUFS

- Il y a deux périodes de pontes par an : du 15 au 30 avril et du 15 au 31 mai.
- 4 à 6 œufs sont pondus. L'incubation dure 12 à 14 jours.
- Les œufs sont bleus pâles ou verts.

COMPORTEMENT

REPRODUCTION

- Pendant la période nuptiale, le mâle effectue une parade en vol pendant laquelle il chante et déploie sa queue pour montrer ses plumes rousses.
- Lorsque la femelle démarre une deuxième ponte, le mâle élève seul les oisillons de la première couvée.

MENACES

Nombre de Gorgebleues à miroir en France :

3 000 à 4 500 couples en France, dont environ 20 couples en Île-de-France. Quelques individus sont observés en migration en Seine-Saint-Denis.

- La disparition des zones humides et ouvertes.
- La pollution des eaux.



GESTION

Les moyens mis en place sur le site de Seine-Saint-Denis pour l'accueil de la Gorgebleue à miroir sont :

- Le maintien de vastes secteurs ouverts en gestion extensive (pâturage...).

1 Hanneton commun
(© Muriel Chevrier - METL-MEDDE)

2 Baies (©CG93)

3 Chenille (© Olivier Brosseau - METL-MEDDE)

4 Papillon (© Olivier Brosseau - METL-MEDDE)

5 Nid de Gorgebleues à miroir
(© Biosphoto - Eero Murtomaki - Photoshot)