



LE PIC NOIR

Dryocopus martius



BOIS ET FORÊTS

CARTE D'IDENTITÉ

TAILLE: 46 cm en moyenne

Poids: 300 à 350 g

ENVERGURE: 65 à 70 cm

DURÉE DE VIE:

11 ans en moyenne

FAMILLE:

Picidés (Pics, Torcols...).

CARACTÉRISTIQUES:

De la taille d'une Corneille, c'est le plus grand des pics. Entièrement noir, il a une calotte rouge vif sur la tête. Chez le mâle, cette calotte rouge s'étend du front à la nuque, alors que chez la femelle, elle se limite à l'arrière de la tête. L'œil et le bec sont jaune pâle.

SON CHANT:

Son chant, très puissant, se compose d'un son ascendant qui s'accélère: «kouic oui couic ouic». En période de reproduction, il tambourine sur les arbres à l'aide de son bec, pendant 2 à 3 secondes, à une cadence de 20 coups par seconde.



Pic noir mâle
(© Biosphoto - Berndt Fischer)

Lors de la saison des amours, en janvier, le pic noir tambourine sur les arbres avec son bec très dur, à une cadence de 20 coups par seconde! Ensuite, il creuse son nid dans le tronc des arbres.

L'ANNÉE DU PIC NOIR

SAISON DES AMOURS	CONFECTION DU NID	PONTE DES ŒUFS	ÉCLOSION DES ŒUFS	ENVOL DES JEUNES	RECHERCHE DE TERRITOIRES LIBRES
JANVIER-FÉVRIER	MARS	AVRIL	AVRIL-MAI	JUIN	SEPTEMBRE
FRANCE					

MIGRATION

Le Pic noir est sédentaire. Il reste en France toute l'année.

HABITAT

LIEU DE VIE DU PIC NOIR

Le Pic noir, qui vit sur un grand territoire, a besoin de grands massifs forestiers aux arbres d'âge et de taille variables, de type conifères ou feuillus et d'espaces ouverts en lisière de forêt.

Il aime les grands arbres, suffisamment espacés entre eux, et semble avoir une préférence pour le hêtre.

EN SEINE-SAINT-DENIS

Cet oiseau est susceptible d'être vu dans la forêt de Bondy, au parc forestier de la Poudrerie, au Bois de Bernouille, au parc Georges-Valbon au parc du Sausset, au parc des Beaumonts et sur la promenade de la Dhuis.



1 Forêt de feuillus
(© Laurent Mignaux - METL-MEDDE)



LE PIC NOIR

Dryocopus martius



NOURRITURE

- Le Pic noir est omnivore : il se nourrit de fourmis, de larves d'insectes mais aussi de fruits et de baies.
- Grâce à son bec très dur, il inspecte les troncs d'arbres, crée des trous (cavités) puis projette sa longue langue pour extraire les larves d'insectes du bois.
- Sa longue langue collante équipée de petits crochets lui permet d'attraper de nombreuses proies cachées sous l'écorce.



HABITAT (SUITE)

NID

- Le Pic noir est une espèce cavernicole.
- Son nid, appelé « loge », de forme ovale, est creusé dans un tronc d'arbre, sain ou malade, mesurant au moins 50 cm de diamètre.
- Le nid est creusé à une hauteur de 4 à 15 mètres au-dessus du sol.
- Une fois abandonné, le nid est utilisé par d'autres espèces (oiseaux : Chouette hulotte, Perruche à collier, Pigeon colombin, Sittelle torchepot ; chauve-souris ; écureuils...).



ŒUFS

- 3 à 5 œufs sont pondus en avril. La période d'incubation dure 12 jours.
- Les jeunes sont élevés essentiellement par le mâle.

COMPORTEMENT

Grâce à des griffes très solides et recourbées (en forme de « X », tel un grappin), le Pic noir arpente les arbres en s'appuyant sur sa queue, tout en effectuant de petits sauts.

REPRODUCTION

- La formation des couples est longue (10 à 15 semaines) et les manifestations territoriales commencent dès janvier.
- Lors de la saison des amours, en janvier et février, il tambourine sur les arbres avec son bec très dur avant de creuser son nid.

MENACES

Nombre de Pics noirs en France :

20 000 à 30 000 couples en France, dont environ 300 à 500 couples en Île-de-France. Environ 3 couples sont présents en Seine-Saint-Denis.

- La disparition des grands massifs forestiers.
- La coupe des vieux arbres.
- Le dérangement.



GESTION

Les moyens mis en place sur le site de Seine-Saint-Denis pour la préservation du Pic noir :

- Le maintien de vieux arbres de grande taille.
- Le vieillissement des arbres.

1 Capricorne (© FCBA)

2 Baies (© CG93)

3 Pic noir dans sa « loge »
(© Olivier Hepiegné)